

Dans la salle de préparation



Conservation

- Conservez le vaccin au froid (de 2 °C à 8 °C) dans un réfrigérateur propre.
- Laissez un thermomètre à minimum et maximum dans le réfrigérateur et vérifiez la température chaque jour.

Préparation au mélange

- Lavez-vous les mains avant de manipuler les vaccins.
- Amenez-les à température ambiante.
- Mélangez-les en suivant les directives indiquées ci-dessous.

Seulement quatre étapes à suivre pour que le vaccin soit prêt à utiliser



Servez-vous du perforateur de transfert pour mélanger les vaccins

1.



Préparation de Circovac®

1. Agitez vigoureusement la petite fiole (suspension d'antigènes).
2. Insérez le perforateur de transfert dans la grosse fiole (émulsion d'adjuvant).

2.



1. Fixez la petite fiole (sous vide) à l'autre bout du perforateur.
2. Le contenu se videra rapidement dans la grosse fiole.

3.



Mélange de Circovac® et Hyogen®

1. Insérez le perforateur de transfert dans la fiole d'Hyogen®.
2. Fixez la préparation de Circovac® (sous vide) à l'autre bout du perforateur.
3. Le contenu se videra rapidement dans la fiole d'Hyogen®.

4. Commencez à agiter doucement la fiole d'Hyogen® jusqu'à l'obtention d'une émulsion blanche homogène. Évitez de mélanger trop vigoureusement, car cela entraînerait la formation de mousse.
5. Ne comprimez pas la fiole, car cela pourrait réduire le volume utile.

4.



1. Fixez la seringue automatique à la fiole d'Hyogen® dans la perforation faite par le perforateur de transfert. La seringue automatique est réglée à 2,5 ml précisément.
2. Tournez doucement et plusieurs fois la seringue automatique fixée à la fiole de vaccin.

Comment mélanger



Renseignements utiles dans la porcherie



Taille recommandée des aiguilles

Soulevez les porcelets âgés de moins de 5 semaines pour les vacciner.

0,9 mm * 13 mm

Vaccinez les porcelets âgés de plus de 5 semaines au sol.

1,3 mm * 16 mm



Autres recommandations

- Changez d'aiguille entre les portées pour réduire au minimum le risque de contamination.
- Vaccinez les porcs qui pèsent jusqu'à 10 kg à environ 1 cm derrière l'oreille et à 1 cm de la colonne vertébrale et de manière perpendiculaire à la peau, afin d'injecter le vaccin profondément dans le muscle.
- Gardez le piston de la seringue automatique enfoncé jusqu'à ce que vous ayez retiré l'aiguille du porc.
- Assurez-vous que le corps de la seringue se remplit correctement.

Vaccination
des porcelets



2,5 ml à partir
de l'âge de
3 semaines



Une injection
intramusculaire